

Superintendent's Office
Mathew Gulbrandsen 2201
Pennington Road Live Oak,
CA 95 953
(530) 695-5400
FAX (5 30) 695-5460



Board of Trustees
Scott Davis
Kathy L. Walker
Tal winder Che tra
Ernest J. Rodriguez
Roger D. Christianson

Estimados Padres,

Es posible que su hijo haya estado expuesto a la enfermedad transmisible marcada a continuación. Si su hijo desarrolla cualquiera de los síntomas enumerados y ha sido diagnosticado con la enfermedad, notifique a la escuela.

- **Varicela:** Fiebre leve generalmente de 13 a 17 días después de la exposición. Aparecen cultivos de ampollas acuosas en el cuerpo, la cara y el cuero cabelludo que luego forman costras. **Mantenga al niño/a fuera de la escuela 7 días desde el momento de la erupción.**
- **Piojos:** Por favor, observe a su hijo en busca de evidencia de piojos. Busque la presencia de liendres: pequeños huevos ovalados blancos que se adhieren firmemente al tallo del cabello. Por lo general, se encuentran alrededor de las orejas y la nuca. La picazón en el cuero cabelludo y el rascado pueden indicar piojos. La recomendación sobre el tratamiento para los piojos se puede obtener de su proveedor de atención médica familiar, un farmacéutico o de la enfermera de la escuela. Recuerde a sus hijos que no compartan peines, cepillos, sombreros, abrigos, etc. Se excluirá a los estudiantes con piojos y no se les permitirá regresar a clase hasta que la familia proporcione prueba de tratamiento con champú para piojos.
- **Infecciones Estreptocócicas:** Escarlatina y faringitis estreptocócica; inicio repentino, generalmente de 2 a 5 días después de la exposición. Fiebre, dolor de garganta, glándulas en el cuello agrandadas y sensibles, la erupción fina aparece con mayor frecuencia en el cuello y el pecho. Dolor de garganta estreptocócico 1s escarlatina sin sarpullido. **Consulte a su proveedor de atención médica; se requiere tratamiento médico.**
- **Impétigo:** Se ven costras y costras y, ocasionalmente, ampollas en la boca y la nariz; también se puede encontrar en otras partes del cuerpo. Las llagas supurantes son contagiosas al contacto. **Consulte a su proveedor de atención médica; se requiere tratamiento médico. El niño puede asistir a la escuela si está bajo tratamiento y el área puede cubrirse.**
- **Tiña:** Del cuerpo; anillo de llagas enrojecidas, secas y escamosas; cuando está presente en el cuero cabelludo, causa áreas de calvicie temporal. Las áreas son contagiosas al contacto. **Consulte a su proveedor de atención médica; se requiere tratamiento médico. El niño puede asistir a la escuela si está bajo tratamiento y el área puede cubrirse.**
- **Sarna:** Pequeñas áreas enrojecidas y elevadas que generalmente se ven entre los dedos, alrededor de la muñeca y los codos, debajo de los brazos y en la línea de la muñeca, que causan una picazón intensa, especialmente por la noche. Rascarse las llagas. Las áreas son contagiosas al contacto. **Consulte a su proveedor de atención médica; se requiere tratamiento médico. El niño puede asistir a la escuela después del tratamiento según lo aconseje el proveedor de atención médica.**
- **Conjuntivitis:** Lagrimeo, dolor, enrojecimiento de los ojos con secreción amarilla (las pestañas se pegan al despertar). Puede ser seguido por sensibilidad a la luz y tener hinchazón. **Mantenga al niño/a fuera de la escuela. Consulte a su proveedor de atención médica; se requiere tratamiento médico.**
- **Quinta Enfermedad:** Enrojecimiento de las mejillas (aspecto de cara abofeteada) seguido de una erupción similar a un cordón en el cuerpo, que puede ocurrir durante 1 a 3 semanas por exposición a la luz solar o al calor. **Consulte a su proveedor de atención médica. Se aconseja a las mujeres embarazadas que consulten a su médico si se ha producido una posible exposición.**

Encinal Elementary (530) 695- 5458

Luther Elementary (530) 695 -5450

Live Oak Middle School (530) 695- 5435

Live Oak High School (530) 695-5415

Live Oak Alternative Schools (530) 695-5430